

Otázka: Smyslové orgány člověka

Předmět: Biologie

Přidal(a): zuzanak

Smyslový orgán = čidlo

- přijímají podněty z vnějšího a vnitřního prostředí

Smyslové receptorové buňky = receptory

- také jiný význam slova receptor = molekulární struktura, která váže neurotransmitery nebo hormony
- převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu (nervová aktivita obsahuje v kódované formě- o kvalitě, intenzitě, místě konání, doba)
- rozdělení receptorů:
 - dle **původu** podnětu:
 - exteroceptory - podněty zvnějšku (čich, chuť, hmat, sluch, zrak)
 - interoceptory - podněty z vnitřku těla, záznam změn ve vnitřních orgánech (chemoreceptory, baroreceptory, proprioreceptory)
 - dle **charakteru** podnětu:
 - mechanoreceptory
 - podmět = mechanická deformace citlivých zakončení smyslových buněk (hmat, rovnováha, sluch)
 - fotoreceptory - podráždění světlem (zrak)
 - chemoreceptory - podráždění chemickými látkami určitého typu (čich, chuť)
 - + termoreceptory - změny teploty (chlad, teplo)
 - + nociceptory - bolest

Nervová aktivita → má povahu nějakých vzorců akčních potenciálů → ty se dostávají nervy

- → do smyslových center v mozku
- → zde jejich zpracování část těchto informací
 - = smyslový vjem
 - 1. vědomá smyslová zkušenost s okolím
 - 2. část nevnímáme př.) změny ve svalových vřeténcích a šlachách

adekvátní podněty = změny, podněty na které smyslové orgány reagují (vysoce) adekvátní

- (př) bubínek - zvuk, sítnice - světlo)
- **hodnota** intenzity podnětu = vyvolání nervového impulsu

1) MECHARECEPTORY

HMAT

- je způsoben hmatovými receptory
- reagují na dotyk a tlak
- vznik:
 - → podráždění volných zakončení
 - někdy přídatné struktury tvořící vazivové pochvy → zvyšuje to jejich citlivost, (př.) Paciniho hmatová tělíska - v prstech jsou nejsložitější
- nejcitlivější = špička jazyku, dlaňová strana konečků prstů
- nejméně citlivý = kůže zad
- + je mnoho hmatových tělísek (Paciniho tělíska, Meissnerova tělíska, Merkelovy disky...)

RECEPTORY ZAZNAMENÁVAJÍCÍ NATAŽENÍ

- (př) ineteroreceptory
- = zaznamenávají velikost krevního tlaku v OS, zvýšení mechanického napětí v plicích

- proprioreceptory
- = zaznamenávají natažení svalů a šlach

PROPRIORECEPTORY prahová

- = zaznamenávají natažení svalů a šlach
- jsou to:
 - a) šlachová tělíška
 - b) svalová vřeténka
- informují o činnosti svalstva potřebné k: udržování postoje těla, lokomoci, koordinaci svalstva
- (spolu se zrakem, hmatem, rovnováhou - rychlý pocit polohy končetin a dání do normálu)

VESTIBULÁRNÍ ORGÁN (= vestibulární ústrojí = rovnovážné ústrojí)

- označuje se také jako **STATOKINETICKÉ ÚSTROJÍ**
 - = protože slouží k udržování vzpřímeného postoje (pomocí reflexních reakcí)
 - jak za
 - a) v klidu (= statická rovnováha)
 - b) v pohybu (= dynamická rovnováha)
- jeho aktivitu si uvědomujeme jen za určitých nepříjemných situací
 - (př) mořská nemoc
 - při déletrvajícím dráždění vestibulárního systému (př. i v letadle atd..)
 - projev: závrať, nevolnost, zvracení
- je součástí vnitřního ucha
 - = útvar ohraničený kostěným pouzdrem v kosti skalní (je součástí kosti spánkové)
 - v kostěném labyrintu je uložen blanitý labyrint
 - prostor mezi labyrinty vyplňuje tekutina = perilymfa
 - blanitý labyrint obsahuje tekutinu = endolympfa (-má jiné iontové složení než perilymfa)
- vlastní vestibulární ústrojí (= jsou zde receptorové buňky)
 - je částí blanitého labyrintu

- skládá se z:
 - KINETICKÉ ČIDLO (= pohybové) = 2x váčky
 - a) váček vejčitý (utrículus)
 - b) váček kulovitý (sacculus)
 - STATICKE ČIDLO (= polohové)
 - c) 3x polokruhové kanálky (jsou na sebe vzájemně kolmé)
 - buňky vestibulárního ústrojí mají vlásky
 - = vláskové buňky (se jim říká)
 - vlásky vstupují do rosolovité hmoty (uložené v endolymfě)
 - jsou v obou váčcích uspořádány ve 2x políčka vzájemně na sebe kolmá
 - v obou váčcích jsou ve vnější vrstvě rosolovité hmoty krystalky CaCO_3 (uhličitanu vápenatého)
 - = otolity
 - → síly (př) gravitační, při zrychlení pohybu) vychylují rosolovitou substanci proti vláskovým b. → způsobí ohýbání vlásků → tím se stimulují receptorové buňky
 - → smyslové signály z nich jsou převáděny na smysloví nervová vlákna VIII. hlavového nervu (= předšíňohlemýžděvý nerv)
 - → ty vedou vzruchy do mozkového kmene a do mozečku a také do spánkového laloku
-
- Vestibulární ústrojí zaznamenává
 - 1) odchylka postavení hlavy a celého těla vzhledem k působení gravitační síly
 - funkce vejčitého i kulovitého váčku
 - 2) změna rychlosti a směru pohybu hlavy a celého těla v prostoru a to:
 - a) při pohybu zrychleném, přímočarém jakéhokoli směru
 - funkce vejčitého i kulovitého váčku
 - b) při zrychleném pohybu kruhovém
 - funkce polokruhovitých kanálků
 - vestibulární ústrojí registruje pouze pohyb zrychlený (ne rovnoměrný)
 - → buňky jsou drážděny jen při změně pohybu (= akcelerace)
 - k udržení rovnováhy napomáhají i informace z hmatových, svalových, kloubních receptorů (i zrak atd..)

SLUCH

SLUCHOVÝ ORGÁN

- uložen v kosti skalní - součást kosti spánkové, kostěný labyrint, blanitý labyrint - hlemýžď
- zaznamenáváme jím energii zvuku
 - šíří se jako vlna zahušťování a zředování molekul (a atomů) plynů (z nich se skládá vzduch — podélné kmitání částic)
- zvuková vlna se projevuje kolísáním tlaku vzduchu → to je vnímáno uchem
 - → sluchový orgán reaguje na tlak vykonaný molekulami (je ze všech mechanoreceptorů nejcitlivější - zaznamenává energii o hodnotě asi $5 \cdot 10^{-23}$ J)
- frekvence vibrací zvukového zdroje (=počet zvukových vln za sekundu)
 - určuje výšku tónu (čím rychlejší vibrace → tím vyšší tón)
 - frekvence je přímo úměrná vlnové délce (tóny o malé vlnové délce mají vysokou frekvenci)
 - lidské ucho vnímá zvukové vlny v rozsahu frekvence 20-20 000Hz
 - nejcitlivější je v oblasti 1 000- 3 000 Hz (= mluvené slovo)
- síla zvuku (= hlasitost)
 - měří se v decibelech
 - je dána velikostí amplitudy
- barva tónu „kvalita tónu“
 - je dána kombinacemi ve frekvenci zvukových vln
 - rozlišujeme asi 400 000 rozlišných druhů zvuků
- → zvukové vlnění prostupuje uchem → zvukové vlny se zachytí na ušním boltci
 - → tlaková vlna potom pokračuje zevním zvukovodem (dlouhý 2-3 cm) (je zakončen bubínkem)
 - → částice vzduchu ve fázi zhuštěného narážejí více na membránu bubínku
 - → a způsobují tak, že se membrána bubínku prohýbá do dutiny středního ucha (MB je mimořádně citlivá→ odpovídá na tlaky, na něž jsou nejcitlivější dotykové receptory zcela necitlivé)
 - → z bubínku se energie zvuku převádí dále dutinou středního ucha (DSU = soustava 3x malých sluchových kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek)
 - → na membránu oválného okénka vnitřního ucha
 - → blanitý hlemýžď (-je ve vnitřním uchu, uložený v kostěném hlemýždi (= perilymfa)
 - = vazivová slepě uzavřená trubička stočená do ulity (2,5 závitů)
 - je vyplněná tekutinou = endolymfou
 - rozděljuje kostěný hlemýžď na 2x patra

- a) předsíňové patro
- b) bubínkové patro
- obě patra se spojují ve vrcholu hlemýždě
- jsou zde receptory zvukových vln = vláskové buňky
 - jsou součástí Cortiho orgánu
 - leží na vazivové membráně dolní stěny blanitého hlemýždě (bazální membrána)
 - svými výběžky se dotýkají krycí membrány
- → oválné okýnko rozechvěje perilymfu (v kostěném hlemýždi)
 - → vlnění se dále přenáší na endolymfu (v blanitém hlemýždi)
 - → kmity endolymfy způsobují posun krycí membrány proti membráně bazální (na které jsou vlasové b.)
 - → vlasové buňky přenáší podráždění na nervová vlákna VIII. hlavového nervu (předsíňohlemýžďový n.)
 - → vede do mozkového kmene → odtud až do spánkového laloku mozkové kůry = sluchové centrum
- sluchové vláskové buňky
 - 1x buňka má cca 100 vlásků (= ciliemů) - ty jsou v těsném kontaktu s krycí membránou
 - relativní pohyb obou membrán vede k → nepatrnému ohybu vlásků → podráždění
 - jsou mimořádně citlivé mohou zachytit výchylku vlásků (blížící se průměru atomu vodíku)

2) FOTORECEPTORY

ZRAK

- pro člověka nejdůležitější smysl (80 % všech informací)
- informace získáváme prostřednictvím zraku jako elektromagnetické záření
 - → to se v oku transformuje na nervové signály
- viditelná vlnová délka 380 - 780 nm
- zrakové vnímání je proces mimořádně složitý (v 1x oku více než 1 mil. receptorových buněk)

OKO (= orgán zraku, oční koule)

- oko je uloženo v dutině = očníci
- stavba oka (je složeno z 6x základních struktur)
 - bělima (= vazivová tuhá blána) (pozorujeme ji jako bílý obal oka)
 - tvoří vnější vrstvu oka
 - udržuje tvar oční koule
 - v přední části přechází v průhlednou rohovku
 - má tvar hodinového skla
 - povrch je chráněn tenkou vrstvou slz
 - cévnatka (= silně prokrvená vrstva)
 - tvoří vnitřní vrstvu oční koule
 - vyživuje oko - bohatě protkaná cévami zásobujícími zevní vrstvy sítnice
 - buňky obsahují pigment → zabraňuje rozptylu světla uvnitř oka
 - ten dává oku jeho barvu
 - modré oči mají nejméně pigmentu (u novorozenců ho ještě tolik není, pak stoupne)
 - - + v přední části přechází v řasnaté těleso
 - = prstenec složený z hladkých svalů a vazivových vláken
 - funkce: zakřivení čočky (= akomodace oka)
 - duhovka (=kruhový terčik z hladkého svalstva)
 - má uprostřed kruhový otvor = zornice
 - → odstupuje od řasnatého tělesa (od výběžku cévnatky)
 - světlo → svaly duhovky se stahují → zmenšení průměru zornice
 - tma → svaly duhovky kontrahují → zvětšení průměru zornice
 - v epitelu (na povrchu duhovky)
 - jsou uloženy buňky obsahující pigment → dávají oku jeho barvu
 - → modré oči mají nejméně pigmentu (u novorozenců není tolik, pak stoupne)
 - → hnědé oči - mají nejvíce pigmentu
 - čočka
 - je zavěšena na řasnatém tělísku
 - tvoří ji rosolovitá hmota (- je dokonale průhledná)
 - na jejím povrchu je jemné vazivové pouzdro
 - uvolněním tahu závěsných vláken řasnatého tělesa → se čočka vyklenuje

- sklivec (= rosolovitá průhledná hmota)
 - vyplňuje oční kouli
 - Světlolomný systém oka (- tvoří ho struktury co spolupracují na tomto ↓)
 - → světelné paprsky procházejí do oka rohovkou
 - → jsou do přední oční komory (- je vyplněna komorovou vodou)
 - → dále čočkou a sklivcem
 - pomocí rohovky a čočky → jsou paprsky soustředěny na sítnici
 - obraz promítaný na sítnici je: - zmenšený - obrácený
- sítnice (= vlastní světločivná vrstva)
 - nejvnitřnější vrstva oční koule (pokrývá její zadní 2/3)
 - slepá skvrna (je zde)
 - = místo kde vychází zrakový nerv (= II. hlavový nerv)
 - ne sítnici se nachází receptorové buňky pro vnímání světla
 - vlastní světločivná vrstva (pozn. od rohovky k sítnici je to 24 mm)
 - podle vzhledu rozlišujeme na:
 - a) tyčinky
 - jsou umístěny na periferii sítnice
 - jsou schopné zaznamenávat velmi malé množství světla
 - působí jako fotoreceptory za šera a v noci
 - nejsou schopni zaznamenat barvu světla (→ pouze odstíny šedi)
 - jejich cca 120 miliónů
 - obsahují rhodopsin
 - = rudě zabarvený pigment citlivý na světlo
 - → když absorbuje světlo → ztrácí barvu (bledne)
 - → a rozpadá se chemicky na 2x podjednotky
 - 1) opsin (= bezbarvý protein)
 - 2) retinal (= derivát vitamínu A)
 - → tato chemická změna je počátkem procesů, které vedou nakonec ke změně akčního potenciálu ve zrakovém n.
 - → z opsinu a retinalu se poté znovu syntetizuje rhodopsin
 - koncentrace rhodopsinu se na tyčinkách zvyšuje ve tmě (→ proto oko reaguje po 15-30 min. mnohem citlivěji než při světle)
 - tento projev se nazývá = adaptace na tmu
 - vitamín A by měl být dodáván pro tělo
 - nedostatek rhodopsinu způsobuje šeroslepost
 - b) čípky
 - jsou méně citlivé a jsou aktivní jen při větších světle

- slouží jako fotoreceptory pro vidění za dne
- rozlišují barvy
- nejvíce čípků soustředěno v centru sítnice
- = žlutá skvrna - používáme ji pro podrobné pozorování
- jejich cca 3 miliony
- čípky jsou v sítnici trojího druhu, každý druh je citlivý na 1x ze 3x základních barev na:
 - → modrou (vlnová délka: 440nm)
 - → zelenou (vlnová délka: 540nm)
 - → červenou (vlnová délka: 575nm)
- → při různě intenzivním dráždění těchto druhů čípků
- → vznikají vjemy různých barevných odstínů (při současném dráždění všech 3x druhů čípků vzniká vjem bílého světla)

PŘIDATNÉ ORGÁNY OKA

- Okohybné svaly
 - příčně pruhované
 - zprostředkovávají pohyb oční bulvy (pomocí signálů z mozku)
 - → obě oči mohou sledovat stejný směr
 - pomocí reflexního mechanismu mohou být oči fixovány na sledování předmětu bez vědomého úsilí
 - šilhání = důsledek zkrácenosti jednoho z okohybných svalů
- Oční víčka
 - chrání oči (uzavírají očnice)
 - zvlhčují oči (mrkání způsobuje zvlhčování očí slzami → zabraňují vysoušení)
- Slzné žlázy
 - vytvářejí slzy
 - jsou uloženy při okraji očnice
 - z vnitřního koutku oka odtékají — do slzného váčku a — do nosní dutiny
- spojivka (= tenká blána)
 - vystýlá vnitřní plochu víček a odtud přechází na přední část bělimy a končí na okrajích rohovky

AKOMODACE OKA

- tvar rohovky a čočky a délka oční bulvy určují bod stýkání paprsků
- akomodaci vykonává čočka
 - a) blízký předmět - čočka se vyklenuje, zhušťuje → větší lom paprsků
 - tento jev se nazývá = akomodace
 - nastává tehdy, když se díváme na předměty 5cm a bližší
 - vyžaduje to trvalou kontrakci svalů v řasnatém tělese → proto namáhavé
 - b) vzdálený předmět - čočka se zplošťuje
 - nevyžaduje kontrakci svalů, ale relaxují
- stárnutí:
 - čočka ztrácí pružnost a schopnost akomodace
 - průhledné transparentní buňky čočky stárnou a odumírají
 - → čočka hůře mění tvar (cca kolem 50 roku života se ztrácí schopnost vidět na blízko)
- nejbližší bod u mladých dospělých - 0,1 metru
- binokulární vidění (dvěma očima) umožňuje hloubkové trojrozměrné vidění

OČNÍ VADY A CHOROBY

- zánět spojivek (konjunktivitida)
 - bývá způsobeno:
 - infekcí, dráždění cizím tělesem, UV záření, znečištěné ovzduší
 - dlouhodobá námaha oka při špatném osvětlení či projev: rýmy (nejčastěji senné), alergie
 - projev: zarudnutí spojivek, pálení, řezání, hlenová až hnisavá sekrece
- krátkozrakost - obraz se promítá před sítnicí, korekce rozptylkami
- dalekozrakost - obraz se promítá za sítnicí, korekce spojkami
- astigmatismus - vadné zakřivení rohovky
- zelený zákal (glaukom)
 - = onemocnění oka způsobené zvýšením nitroočního tlaku
 - jestliže není léčen → může vést až k slepotě
- šedý zákal (katarakta)
 - = onemocnění, kdy se snižuje průhlednost čočky
 - usazování tukových látek na čočce
 - léčba: chirurgicky odstraní čočku a dají umělou nitrooční čočku

- barvoslepost (daltonismus) – porucha v rozlišování některých barev, většinou dědičná
- slepota – poškození různých částí oka, může být i dědičná
- šilhání (strabismus) – poruchy v souhře okohybných svalů
- ječné zrno – zánět Meibomových žláz

3) CHEMORECEPTORY

- = smyslové buňky reagující na přítomnost chemických látek v okolí
- vyžadují přímý kontakt se substancemi

CHUŤ

- chuťové receptory jsou uloženy v chuťových pohárcích na jazyku a na patře
- špička jazyka a při jeho okrajích – nejvíce receptorů (cca 10 000)
- chuťové vjemy 4x základní: (- ostatní vjemy vznikají jejich kombinací – rozlišujeme cca 10 000)
 - → sladko
 - → kyselo
 - → slano
 - → hořko
- evolučně se vyvíjí – chutnají nám věci co nejsou jedovaté
- citlivost chuťových receptorů je pro různé látky různá
 - př) alkaloid chinin zjistí ho v koncentraci v roztoku kde má $0,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$
 - NaCl v koncentraci $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$
- na chuťovém vnímání se podílí i čich (př) ztráta chuti pře nosní nemoci)
- chuť má význam
 - pro řízení činnosti trávicího ústrojí
 - pro reflexní vylučování slin, žaludeční a pankreatické šťávy

+

- inervace: VII., IX., X. mozkový nerv
- chuťové centrum: kůra temenních laloků
- cirkadiánní kolísání citlivosti (nejvyšší brzy odpoledne)

ČICH

- čichové receptory jsou v malých ploškách čichového epitelu (= specializovaná tkáň a oblast sliznice na stropu nosní dutiny)
 - + 1 milion smyslových buněk na ploše 500 mm²
- fyziologický mechanismus není doposud znám
 - → vjemu jsou zřejmě vyvolávány současným drážděním receptorů různých typů
- u člověka méně vyvinut než u zvířat → ale stále velmi vysoká citlivost
 - u člověka je čich méně významný než zrak a sluch (= rozdíl s mnoha živočichy)
 - jsme citliví zejména na sirné sloučeniny (př) methymerkaptan již v $2,5 \cdot 10^{-10}$ mg na l vzduchu)
 - některé látky však pro nás čichem nezjistitelné (př) CO (= oxid uhelnatý)
- rychlá adaptace (= snížení citlivosti vůči předmětu při delším působení)
 - některé látky mohou zabránit vnímání jiných látek (ve chvíli adaptace atd.)
- centra čichu:
 - a) fylogeneticky staré části koncového mozku
 - b) spodina čelního laloku
- evolučně se vyvíjí (př) dříve jsme cítili hodně zkažená vejce → proto sirovodík

4) TERMORECEPTORY A NOCICEPTORY

- jsou to velmi jednoduché receptory a tvoří složitější čidla
 - → nejsou samostatnými smyslovými buňkami, ale jen volnými zakončeními dostředivých nervových vláken

a) TERMORECEPTORY

- = receptory na teplo a chlad
- Teplo a chlad mají každý svůj samostatný typ receptoru
 - a) tepelné receptory
 - jsou uloženy hlouběji v kůži

- nejvíce: kůže obličeje, kůže hřbetu ruky
- nejméně: kůže zad
- b) chladoví receptory (jejich až 8x více než teplených receptorů)
 - jsou uloženy v povrchu kůže

b) NOCICEPTORY

- = receptory na bolest
- bolest = informace o ohrožení, či poškození organismu
 - → má značný biologický význam
- receptory bolesti jsou často stimulovány chemickými látkami, které jsou uvolňovány z poškozených tkáňových buněk (zde jsou tedy jakoby zvláštními typy chemoreceptorů)
- některé bolestivé podměty vyvolávají reflexní odpovědi (= obrané reflexy (př) odtažení ruky)
- receptory bolesti podávají zprávu o bolesti:
 - a) bolest povrchová (z kůže)
 - b) bolest útrobní (z vnitřních orgánů – hrudní a břišní dutiny)
- neadaptují se = nesnižuje se jejich citlivost př) trvalá bolest zubů

KOŽNÍ ČIDLA

- = označujeme tak některé nociceptory spolu s hmatovými receptory v kůži
- jejich společnou činností se vytváří jiné vjemy (než jsou pro jednotlivé normální)
- př) vnímáme tak: (hladkost / drsnost), (vlhkost / suchost)

1. [Smyslová soustava - maturitní otázka](#)
2. [Smyslová soustava - maturitní otázka \(2\)](#)
3. [Smyslová soustava člověka - maturitní otázka](#)