

Otázka: Tělní tekutiny

Předmět: Biologie

Přidal(a): Evca.cel

Základní popis

- zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí – **homeostázu**
- vodné roztoky organických a anorganických látek
- **funkce** – rozvod živin po těle, odvod zplodin metabolismu, homeostáze
 - **nitrobuněčné** (intracelulární) – součást buněk, 32-40% hmotnosti těla, 55% celkové tělesné vody
 - **mimobuněčné** (extracelulární) – 21% hmotnosti těla, 45% celkové tělesné vody
 - **cévní** – krev, lymfa
 - **mimocévní** – vyplňuje mimobuněčné prostory, zabezpečuje výživu, tkáňový mok, mozkomíšní mok, komorová voda v oku, kloubní maz, moč, ušní tekutiny

Tkáňový mok

- **10,5l**
- mimobuněčná, mimocévní tekutina, vyplňuje mezibuněčné prostory (př. mezi mozgovými plenami)
- podobné složení jako krevní plazma (méně bílkovin)
- vznik – z krve prostupováním tekutiny z krve přes krevní kapiláry
- z něj se tvoří míza
- → funkce – **výživa jednotlivých tkáňových buněk**

Míza (lymfa)

- nažloutlá tekutina podobného složení jako krevní plazma (mnohem méně bílkovin, více tuků, přítomnost lymfocytů); mimobuněčná, cévní struktura
- proudí v lymfatických cévách ústících do krevního řečiště; vzniká z tkáňového moku
- → funkce - transport látek z tkáňového moku do krve, ochranná

Krev

- **5-6l muži, 4,5l ženy, 8-9% hmotnosti těla**
- mimobuněční, cévní tělní tekutina; červená, neprůhledná tekutina
- funkce
 - **transport** (O₂, živiny - cukry, tuky, bílkoviny, hormony, vitamíny)
 - **termoregulace** - váže na sebe teplo
 - **odvod** zplodin metabolismu, schopnost udržovat stálé vnitřní prostředí - homeostázi (stálý osmotický tlak v b., pH krve)
 - **obranná fce** proti infekci - schopnost srážet se
- složení - krevní plazma (zákl. mezib. hm.), krevní b. (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)

Krevní plazma

- **3l, pH 7,4**
- zákl. mezib. hmota - tekutá; průhledná, nažloutlá tekutina
- **anorg.l.** - 90% **voda** (vázaná na bílkoviny, volná, rozpouštědlo pro další látky), **solí** (NaCl - důležitá pro homeostázi, Ca - tvorba kostí, zubů, P - kosti, I - štítná žláza...)
- **org.l.** - **plazmatické bílkoviny** - tvorba v jádrech - **albuminy** (váží na sebe vodu - udržení objemu krve, přenos enzymů, váží se hormony), **globuliny** (produkt spec.b. mízní tkáně, obranná fce, imunoglobuliny - zneškodňují škodlivé l.), **fybrinogen** (srážlivost krve), **heparin** (protisrážlivé faktory); **cukry** - glukózy

Erytrocyty (červené krvinky)

- **4,5 - 5,5 mil/mm³**
- **fce - přenos** O₂ z plic do tkání, odnos CO₂ do plic
- tvar - kulovitý, uprostřed promáčklý, ze strany - piškotovitý tvar; **bezjaderné** - nedělí se
- v cytoplasmě červené barvivo - **hemoglobin** (bílkovina globin + hem - barevná složka, Fe - váže O₂)
 - hemoglobin + O₂ - **oxyhemoglobin** - volná vazba - snadné uvolnění
 - hemoglobin + CO₂ - **karboxyhemoglobin** - pevná vazba, již se nedá navázat O₂ → až udušení
- vznik (= erythropoéza) - kostní dřeň všech kostí, plod - játra
- tvorba řízena - hormon **erythropoetin** z ledvin; důležitá přítomnost vitamínu B12, kyseliny listové, bílkovin, Fe
- životnost - **100 - 120 dní**
- zánik - slezina, játra - Fe využito na tvorbu nových červených krvinek, zbytek přeměněn v játrech na žlučová barviva
- v plazmě jsou v izotonickém prostředí
 - hypotonický roztok - praskání erytrocytů - **hemolýza**
 - hypertonický roztok - sraštění erytrocytů
- **anémie** - chudokrevnost

Leukocyty (bílé krvinky)

- **4 000 - 10 000/mm³**
- větší než erytrocyty, různý tvar, mají jádro
- rozdělení podle tvaru b. jádra a barvitelnosti granulí v cytoplasmě - granulocyty, agranulocyty
- **1. granulocyty** - 70% leukocytů
 - členité jádro, v cytoplasmě - zrníčka - granula - produkují chem.l. ničící mikroorganismy, zabarvené
 - **neutrofilní** - neutrální barviva granul; **eozinofilní** - kyselá barviva; **bazofilní** - zásaditá barviva, obsahují heparin
 - neutr. + bazof. - schopnost fagocytózy
 - vznik mízní uzliny, kostní dřeň, slezina
- **2. agranulocyty** - 30% leukocytů, nejsou granuly, nemají členité jádro
 - monocyty - do tkání jako makrofágy (fagocytóza)
 - lymfocyty - **T-lymfocyty** (dozrávají v brzlíku, buněčná imunita, rozpoznají nádorové buňky, buňky transplantovaných orgánů); **B-lymfocyty** (humorální - látková imunita, tvorba imunoglobulinu, ochrana těla před antigeny)

- životnost - **12 hodin**
- → fce - **obránná**
- patologické zmnožení (nefunkční) - leukémie (rakovina krve)
- **diapedéza** - schopnost leukocyt prostupovat stěnou cév a pohybovat se k místu infekce
- **fagocytóza** - zneškodňují škodlivé látky (pomocí panožků vtáhne org. do nitra- zničení pomocí enzymů)

Trombocyty (krevní destičky)

- **200 000 - 300 000/mm³**
- nejmenší krevní b. nepravidelného tvaru
- vznik - kostní dřev - z velkých b. (megakaryocyty); **nemají jádro**; obsahují ionty Ca
- životnost - **2-4 dny**
- → fce - **srážení krve**
- porucha srážlivost - **hemofilie** (dědičná)

Sedimentace červených krvinek

- = usazování - vyvoláno hmotností, gravitací
- měření - trubice dělená na 150mm - výsledky se sčítají po 1 hodině
- muži za hod. - 2-5mm, ženy za hod. - 3-8mm ; vyšší hodnoty - nemoc
- **hematokrit** - odměrný válec ustáté centrifugované krve, udává podíl krevní plazmy a krevních tělísek (ženy asi 39%, muži 44%)

Srážení krve (hemostáza)

- srážení - pokud je krev mimo cévy
- v krevní plazmě je **fibrinogen+proteomptin** (k tvorbě vitamínu K, za přítomnosti Ca (v krevních destičkách) se přemění na enzym - trombin) - **trombin** řídí **přeměnu fibrinogenu na fibrin** (nerozpustný, vláknitý) - zachytí se ve shluku krevních destiček - krevní sraženina - zpevní se a uzavře porušenou cévu - začne působit **heparin**
- nedostatek heparinu - vznik trombóz - ucpávají cévy
- **sérum** - krevní plazma zbavená fibrinogenu, vzniká po srážení krve, po jeho zaschnutí

vzniká stroupek

Krevní skupiny - A, B, AB, 0

- Jan Jánský - 1907 - český lékař - rozlišuje 4 krevní skupiny
- 2 aglutinogeny - A, B - na jejich základě rozlišuje 4 skupiny
 - **skupina A** (aglutinogen A) - aglutinin anti-B; **skupina B** (aglutinogen B) - aglutinin anti-A
 - **skupina AB** (aglutinogen A i B) - aglutininy chybějí
 - **skupina 0** (aglutinogen chybí) - aglutinin anti-A i anti-B
- aglutinin - protilátky v krevní plazmě
- krevní plazma obsahuje vždy protilátky proti tomu z antigenů, který není přítomen na membránách vlastních erytrocytů
- pokud by se krvinky dostaly do styku s plazmou obsahující protilátky proti jejich antigenům, nastala by aglutinace (shlukování) krvinek - až smrt
- transfúze krve - **křížová zkouška** - zjišťuje se kompatibility (slučitelnost) krve dárce a příjemce
- **Rh faktor** - lidé s tímto faktorem Rh pozitivní - Rh+ - asi 85% lidí, způsobeno přítomností antigenu D; bez tohoto faktoru - Rh negativní - Rh-
- v krvi Rh- lidí se normálně nevyskytují protilátky proti Rh faktoru, mohou se však vytvořit u Rh- matky s Rh+ plodem a ohrozit tak plod (vznik anémie - hemolýza červených krvinek plodu) nebo při transfuzi krve Rh+ do těla jedince s krví Rh-

1. [Tělní tekutiny - maturitní otázka](#)
2. [Tělní tekutiny - maturitní otázka \(2\)](#)
3. [Tělní tekutiny - maturitní otázka](#)